

TrichoAdvance® SOIL

FICHA TÉCNICA
Agosto-2019

COMPOSICIÓN		PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	
INGREDIENTES	CONTENIDO	VIABILIDAD	VALOR
Microorganismos	3,0 % p/v	<i>Trichoderma harzianum</i> , <i>Trichoderma atroviride</i> cepa AA211, <i>Trichoderma asperellum</i>	1 x 10 ⁸ UFC/mL
Ingredientes inertes	97 % p/v		
Metales pesados: Pb < 2,0 ppm; As < 2,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm			
		PARÁMETRO	VALOR
		Solubilidad en agua a 20 °C	> 99 %
		pH	3,0

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Trichoadvance® Soil** es un complejo biológico de cepas activas de *Trichoderma* spp. las cuales presentan un efecto bioestimulante. Estos microorganismos tienen la capacidad de multiplicarse en el suelo y colonizar las raíces de las plantas, y es en este proceso donde producen promotores de crecimiento que estimulan el desarrollo de las plantas y la germinación de semillas.

PRECAUCIONES

- **Incompatibilidad:** Trichoadvance® Soil es incompatible con fungicidas y antibióticos
- **Compatibilidad:** Con bioestimulantes, insecticidas y nematocidas.
- **Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.
- **Periodo de Carencia:** No tiene.
- **Tiempo de reingreso:** No tiene restricciones al reingreso.
- **Almacenamiento:** El envase sellado de Trichoadvance® Soil conserva su efectividad por 6 meses desde su fecha de elaboración, mantenido en condiciones de refrigeración (4°C) en forma continua. No guardar junto con alimentos.
- **Equipo de seguridad:** Usar equipo de protección personal de buenas prácticas de higiene industrial. Trichoadvance® Soil no es considerado un producto peligroso, pero en contacto con la piel podría provocar irritación.

RECOMENDACIONES DE USO PARA FERTIRRIEGO

CULTIVO	APLICACIÓN	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Almendra, Avellano europeo, Nogal	10 L/ha	A inicio de crecimiento radicular. Primavera y Otoño
Cerezo		
Vid vinífera, Pisquera y de mesa		Aplicar al suelo antes y después de la siembra o plantación
Brócoli, Lechuga, Tomate.		
Arándano, Frutilla, Frambuesa, Mora.		Inmersión del bulbo pre siembra. Aplicación dos veces en la temporada
Cebollas, Ajos.		Aplicar a la siembra, desmalezado y aporque
Papas.		