

# TrichoAdvance® Foliar

FICHA TÉCNICA  
Agosto-2019

COMPOSICIÓN		PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	
INGREDIENTES	CONTENIDO	VIABILIDAD	VALOR
Microorganismos	3,0 % p/v	<i>Trichoderma asperellum</i> , <i>Trichoderma atroviride</i> cepa AA211, <i>Trichoderma atroviride</i> cepa AA213	1 x 10 <sup>8</sup> UFC/mL
Ingredientes inertes	97 % p/v		
Metales pesados: Pb < 2,0 ppm; As < 2,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm			
		PARÁMETRO	VALOR
		Solubilidad en agua a 20 °C	> 99 %
		pH	3,0

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Trichoadvance® Foliar** es un complejo biológico de cepas activas de *Trichoderma* spp. las cuales presentan un efecto bioestimulante. Estos microorganismos han sido seleccionados por presentar alta capacidad de adaptación a las condiciones existentes en el follaje, lo que permite una rápida colonización y multiplicación en la superficie de hojas y brotes, generando competencia por espacio y nutrientes.

## PRECAUCIONES

- **Incompatibilidad:** TrichoAdvance® Foliar es incompatible con fungicidas y antibióticos
- **Compatibilidad:** Con bioestimulantes, insecticidas y nematocidas.
- **Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.
- **Periodo de Carencia:** No tiene.
- **Tiempo de reingreso:** No tiene restricciones al reingreso.
- **Almacenamiento:** El envase sellado de TrichoAdvance® Foliar conserva su efectividad por 45 días desde su fecha de elaboración, mantenido en condiciones de refrigeración (4°C) en forma continua. No guardar junto con alimentos.
- **Equipo de seguridad:** Usar equipo de protección personal de buenas prácticas de higiene industrial. TrichoAdvance® Foliar no es considerado un producto peligroso, pero en contacto con la piel podría provocar irritación.

## RECOMENDACIONES DE USO PARA APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVO	APLICACIÓN	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arándano, Frutilla, Frambuesa, Mora	1,5 a 2 L/ha	Tres aplicaciones en temporada: inicio floración, crecimiento de fruto y pre cosecha
Brócoli, Lechuga, Tomate	1,5 L/ha	Aplicación foliar cada 10 días
Cebollas, Ajos	1 L/ha	Aplicación foliar dos veces en temporada
Cerezo	1-2 L/ha	Aplicar después de cuaja, 2 veces en la temporada
Nogal	1-2 L/ha	Aplicar al follaje, una vez terminadas las aplicaciones de cobre
Vid vinífera, Pisquera y de Mesa	1,5 L/ha	Floración. Repetir cada 10 días, 2 aplicaciones entre pinta y pre cosecha

